

14  
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICO-  
PRACTICA,

---

DE  
INFLAMMATIONIBVS  
ERYSIPELACEIS,

---

QVAM,  
VELIFICANTE NUMINIS SUPREMI GRATIA,  
RECTORE VNIVERSITATIS MAGNIFICO,  
PRÆNOBILI ET CONSULTISSIMO  
DN. TOBIA JAC. REINHARTHO,

JCTI, SACRI PALATII CÆSAR. COMITE, JURID. FACULT. ASSESSORE,  
ET PROFESS. COD. PVBL. ORDIN. CIVITAT. SYNDICO  
ET CONSVLE,

AUTORITATE ET DECRETO GRATIOSÆ FACULTATIS  
MEDICÆ IN PER-ANTIQUA HIERANA,  
SVB PRÆSIDIO

LAUDATISSIMI ORDINIS MEDICI DOMINI SENIORIS,

DN. D. HERMANNI PAVLI JVCHII,

SERENISS. DVCVM SAXO-VINAR. ET ISENAC. CONSIL. AVLIC. ET ARCHIAT.  
PATHOL. ATQVE PRAXEOS PROFESS. PVBL. PRIMAR. ACADEM.  
CÆSAR. NAT. CVRIOS. COLLEGÆ,

PATRONI AC PROMOTORIS SVI COLENDISSIMI,

PRO DOCTORIS GRADV

SVMMISQVE IN ARTE SALVTARI PRIVILEGIIS ET  
IMMVNITATIBVS RITE ET SOLENNITER  
IMPETRANDIS,

PUBLICÆ ERVDITORVM DISQVISITIONI SVBMITTIT,  
AVTOR ET RESPONDENS,

JOHANNES FRIDERICVS RILCKIVS,

*Bolckenbayna-Siles.*

IN AVDITORIO MAJORI COLLEGII MAJORIS, HORIS CONSVETIS.  
DIE XXII. NOVEMBRIS M DCC XXXII.

ERFORDIÆ, Typis JOH. CHRISTOPHORI HERINGII, Acad. Typogr.



VIRO  
SUMME REVERENDO, AMPLISSIMO  
ATQVE DOCTISSIMO  
DOMINO  
LAVRENTIO  
BAVDISIO,

DVCATVS LIGNICENSIS SVPERINTENDENT  
MERITISSIMO, ECCLESIAE SS. PETRI ET PAVLI PASTOR  
VIGILANTISSIMO, CONSISTORII REGII ASSESSORI  
ET CONIUNCTARVM SCHOLARVM LIGNI-  
CENSIVM PRÆSIDI GRAVISSIMO,

DOMINO PATRONO  
ET MÆCENATI SVO

ÆTERNVM SVSPICIENDO,  
AD RECOLENDAM BENEFICIORVM INSIGNIVM  
ACCEPTORVM MEMORIAM  
PERENNE GRATITVDINIS MONVMENTVM  
CONSTITVTVRVS,

DISSERTATIONEM HANCCE INAUGVRALEM

EA QVA DECET ANIMI REVERENTIA  
DEVOTE

D. D. D.

AVTOR ET RESPONDENS.





## PROÆMIUM.



Anguinis per totum corpus diffusam ita dictam massam, in continuo, libero, tranquillo & proportionato motu progressivo seu circulatorio, e corde nempe ad partes progrediente & ex his iterum ad cor redeunte, conservari debere, quamdiu vita & sanitas durant vigentque, Physiologia olim docuit & experientia, optima rerum magistra, confirmavit; Ejusdem vero purpurei laticis ac reliquorum machinæ nostræ corporeæ humorum motum qualemcunque irregularem, ebullitionem orgasticam, congestionem versus certa tantum loca impetuosiores & exinde dependentem stagnatio-



gnationem aut stasin plenariam, multorum, imò plurimorum, morborum esse causam, eamque exinde omnium optime derivari & illustrari posse, ex Pathologia abunde liquet omnesque fere uno ore profitentur rationales Medici. Non lubet jam, pro confirmando hocce asserto, graviores & admodum perniciosos illos viscerum, tam nobiliorum, quam ignobiliorum, abinde provenientes infarctus, obstructions & scirrhos in medium producere, neque etiam ingentis illius rhevmaticorum, spasticorum, inprimis arthriticorum, aliorumque consimilium admodum molestorum affectuum catervæ hunc in finem facienda erit mentio, sed sufficiet nobis *inflammationes* tantum exempli loco adduxisse, quippe quæ primam atque primariam suam originem ordinarie stasi cuidam suspectæ, a prægresso inordinato aliquo humorum motu superstiti, debent, hujusque respectu provido & salutari admodum consilio, a principio nostro vitali suscipiuntur, sed eventu ut plurimum admodum ambiguo, præprimis si in interioribus magis quam exterioribus & sanguiferis magis, quam ex sanguibus



guibus partibus occurrant, ob facile supervenientem nimirum Gangrænam aut ipsam quoque putridam seu sphacelosam corruptionem, qualia itidem, aut saltem non nisi gradu ab his discrepantia pericula, quandoque a superficialibus istis extremam externi corporis superficiem, seu cutem, tantum occupantibus, alias erysipelaceis dictis inflammationibus, pertimescenda sunt, maxime si imprudenter vel per commoventia & humores nimium exagitantia remedia irritentur, vel per refrigerantia & adstringentia repellantur, sicque humoribus ad terminos jamjam quasi promotis motus retrogradus cum summo ægrotantium vitæ discrimine inducatur: Tunc enim, si perversa hacce medendi ratione affectus talis, cæteroquin utplurimum mitior, antiquas vias relegere massamque humorum denuo inquinare & novam ipsi labem affricare coactus fuit, communiter tanto fortiora, graviora & periculosiora mala, pectoris nempe oppressiones, cordis angustationes, bronchiales suffocationes, convulsiones, hydropes pectoris, apoplexiæ, epilepsiæ, aliaque fontica perniciofa & non raro lethalia pathemata invi-



tantur & producuntur. Hinc quoque non immerito operæ pretium fore mihi visum fuit, si loco Thematis inauguralis genuinam harum *inflammationum* originem, indolem atque curandi methodum, Gratioſo Inclſyti Medicorum Collegii conſenſu, pro virium modulo ingeniique imbecillitate explicare & delineare allaborarem: Quod ipſum, ut felici fiat auſpicio, in divini Nominis Gloriam proximique ægro- tantis qualecunque emolumentum, ſupplex humilisque nunca Deo T. O. M. contendo & obſecro.

§. I.

**U**ſitatiffimum illud & Græcis pariter ac Latinis Scriptoribus receptiffimum *Erysipelatis* vocabulum cum obſcuræ admodum ſit originis, utique requirit, ut priusquam nos ad realem affectus per illud denotati explicationem accingimus paucis quoque unde proprie deſumtum & compoſitum ſit, inquiremus & demonſtremus. Quibusdam ergo placet illud ab ἐρύειν vel ἐρύεσθαι, quæ idem ſunt, ac εὔειν vel εὔεσθαι, *trahere* vel *trahi*, & adverbio πέλαις *prope*, quod, addito articulo, jura & formam nominis recipit & propinquum denotat, derivare ſicque ſimul indolem ejus vagam adumbrare, quod nimirum perquam facile ad viciniam, ſeu loca propinqua ſe trahat & traha-



*trahatur* eaque propter nimium corruptis vocabulis, propriè vicinitrahā aut vicinitractā appellandam esse hanc affectionem autumant. Alii cum Fallopio vocabulum hoc à græco ἐρυσίση, i. e. *rubigine in frumentaceis* & πέλας *prope*, deducere amant, quoniam nimirum pars Erysipelate afflicta accederet *prope ad colorem spicæ, quam rubigo deturpavit*. Alii denique ad mentem POLLVCIS Lib. IV. Onomast. adjectivum ἐρυσόν, pro quo *rubrum* Latini dicunt, non inepte huc adsciscere eidemque natales hujus nominis adserere solent præprimis quia animadvertunt antiquioribus solennem admodum fuisse vocis ἐρυσος pro ἐρύδρος usum, ita, ut hac ratione unice a *rubore*, quo pars læsa sub hoc affectu oculos ferit, desumta videatur hæc denominatio.

§. II.

Quoad *Synonymiam* affectus hic duplex adhuc græcum nomen sortitus est ab HIPPOCRATE, dum Sect. V. Aphor. 23. ἐπιφλόγισμα, & alibi πῦρ ἀγγιον vocatur. Latini, licet & suum fecerint græcum nomen *Erysipelas*, vel juxta CELSVM *Erysipela*, aliquando tamen etiam diversas alias appellationes huic substituerunt: Quidam simpliciter ignem vocant, procul dubio a sensu acrioris, quem infert, Caloris; alii huic adhuc peculiariora conjungunt epitheta, & vel *ignem sylvaticum*, aut quasi *Sylvestrem* & *efferatum*, ob caloris ferociam; vel *Ignem Persicum*; vel *sacrum* seu *magnum*, quoniam veteres illud, quod magnum erat, etiam *sacrum* vocare sueverunt; vel denique *Ignem S. Antonii* appellitarunt, quoniam ipsum hunc virum sanctum, tanquam tutelare in incendiis Numen, contemptores sui hac veluti

lutā



luti ferali flamma punire crediderunt, quanquam etiam ab aliis hoc pro *Gangraenæ* aut *Erysipelatis exulcerati* synonymo habcatur. MESVES & AVICENNA ipsi spinæ titulum imposuerunt, ob doloris pungitivi, ad modum punctiōnis spinæ membra ab Erysipelate occupata urgentis, sensum. A PLATERO *Cap. II. de Febr. p. 16.* minus apposite vocatur *Carbunculus*, quod nimirum enata macula referat ruborem flavescentem gemmæ sic appellatæ, cum tamen potius singulari cuiuspiam, multumque a nostro affectu diverso tumoris inflammati generi, competat hæc appellatio. Magis congruus autem videtur *Rosæ* titulus, a quamplurimis huic affectui impositus, ob suavem illum, quo incarnatos roseti flores succensa cutis æmulatur, colorem, quod etiam Germani, eundem communissime *die Rose* salutantes adprobare videntur, quemadmodum & illi non prorsus injuste faciunt, qui *febrem ἐρυσιπελατώδην* ipsum nuncupant, a palmario nempe & primario symptomate, quo ut plurimum stipatus incedit hic affectus, nempe febre, pro ratione circumstantiarum & ipsius staseos qualitate, modo graviori, modo leviori existente. Ab his etiam non multum discrepant reliquæ Germanorum denominationes, quando nimirum termino usitatori *das Rothlauff*, item *das wilde Feuer*, *Flug-Feuer*, *St. Antonini Plag* &c. &c. insignire solent peculiare hoc inflammationis genus.

§. III.

Quoniam vero ratione Homonymiæ vocabuli *Erysipelatis* nihil fere habemus, quod peculiari annotatione dignum esset, nisi quod a quibusdam Pathologis

gis



gis in paulo generaliori & specialiori sensu quandoque accipiat, nempe vel de qualicunque inflammatione superficiali, a quacunque humorum stasi inducta, vel tantum de simili inflammatione ob sanguineam stasim proprie causata, quæ ultima usitatissima est acceptio, quam & hic loci retinere placet; hinc ad realem inflammationum erysipelacearum definitionem potius nos accingimus, atque sequentem de illis pro fundamento hujus tractationis ponimus, quod sint *peculiare negotium vitale principii nostri agentis & rationalis, sub quo, illud, mediante auctiori motu humorum congestorio & progressivo stasim quandam sanguineam in superficies extrema cujusdam partis membranaceæ hærentem, sicque tumorem aliqualem in latitudinem æqualem magis diffusum, mediocriter ardentem & dilute roseum inducentem, resolvere & discutere, ac insimul metuendam alias corruptionem fermentativam acrem avertere allaborat.*

#### §. IV.

Ne autem peculiare hasce inflammationum species cum reliquis nempe phlegmonodeis & apostematoides, forsitan confundamus, ante omnia quam ratione illæ ab his potissimum differant, demonstrandum erit. Conspirant equidem erysipelaceæ inflammationes satis exquisitè cum phlegmonodeis, eademque fere signa diagnostica exhibent, possunt tamen etiam facile ab iisdem distingui & quidem I) quoad *essentia- lia & concomitantia symptomata*: Phlegmone enim, ut verba Celeberr. Dom. Profess. JUNCKERI, Præceptoris mei æternum devenerandi, in *Conspectu Medic. Theoret. Pract. Tab. XX. pag. 161.* mea faciam, est species in-

B

flam-



inflammationis, quæ stasin sanguinis intra poros & tenuissima vascula in *latum* & *profundum* factum, involvit & sæpius insimul a metastasi quadam febrili exoritur, adeoque necessario insimul exquisitiores & graviores motus febriles simul inducit, quam Erysipelas, quod quidem majorem fervorem & ardorem in parte affecta præcipue exhibet, ita ut etiam cuticula exinde quasi exarescat, rarius tamen graviolem quandam febrem secundariam comitem habet, nisi forsitan magis diffusa quædam stasis, maxime circa nobiliorem & sensibiliorem partem, illud invitaverit. Proinde etiam color partis affectæ in his inflammationibus magis ad flavedinem seu dilute roseum, in phlegmonodeis vero ad saturatiorem ruborem vergit, ac insuper si pars ista quodammodo comprimitur, non ita facile disparet, uti in illis, nec etiam tam repente augefcit. Sic quoque differunt hæ inflammationes 2) *quoad effectus*, seu *consequentia*, dum *dolor* in erysipelaceis est magis punctorius & lancinatorius, in phlegmonodeis vero magis distensivus; *tumor* in his plerumque satis magnus, in uno loco permanens atque fixus, & carnem cuti subjectam aut ipsam parenchymatos substantiam occupans; in illis vero communiter humilis, serpendo ad vicinam crescens atque extus in cute, vel intus in extrema viscerum membrana hærens, observatur.

§. V.

Ab *apostematode inflammatione* hæc nostra admodum facile distingui potest, quoniam illa quidem pariter in superficie, vel sub ea occurrit, sed arctiori insimul spatio circumscripta est atque partis illius, tam carno-

sæ,



sæ, quam glandulosæ, quam semel occupat, profunditatem magis penetrat, qualequid nunquam in Erysipelate observatur. Sic quoque a *Gangræna* & *Carbunculo* satis exacte differt Erysipelas, gradu nimirum malignitatis & periculi, quippe cujus intuitu ab illis longe exsuperatur, ob graviores nimirum morbos, qui eosdem ordinarie antecedunt, quorumque symptomata pedissequa existunt, siquidem etiam insuper *Gangræna* non solum musculosas sed & tendinosas & nervosas, *Bubones* vero glandulosas partes occupant, ardorem & dolorem intensiorem inferunt, tumoremque duriores cum rubore saturatiori exhibent. Ab *Herpete* denique, *Purpura*, *Variolis*, *Morbillis*, *Scarlatina* febre aliisque cum maculis rubicundis prodeuntibus febribus quantum differant hæ inflammationes, jamjam in propatulo est & ulteriori non indiget demonstratione.

§. VI.

Non solum autem ab aliis consimilibus fere affectibus, sed & a se ipso probe distinguendum venit Erysipelas, ob diversas ejusdem species diversamque faciem, quam secundum causarum aliarumque circumstantiarum peculiarem rationem exhibere solet: Generatim enim, ratione causæ materialis, dispescitur in *exquisitum*, quod a stasi pure sanguinea dependet, & *spuriū* seu *œdemadotes*, quod rarius occurrit & majori cum tumore minorive rubore & dolore conspicuum est, originem suam a stasi sanguineo-seroso-mucosa sumit ac potissimum cachecticis & scorbuticis subjectis familiare existit, atque inter vulgus communiter *die weiße Rose* audit. Quoad invadendi modum non inepte di-



viditur in *vagum* & *fixum* nec non *simplex* & *vesiculare*: *vagum* seu obambulans, in parte illa, quam semel occupavit, non diu persistit, sed ab una ad alteram semper progreditur & herpetis more sensim in vicinas regiones serpit, hacque ratione non raro totum corpus percurrere solet, quemadmodum inter alios tale etiam se observasse refert MENZELIUS in *A. N. C. Decur. III. Ann. IV. Obs. 82.* quod a dextra gena ad sinistram, hinc per frontem ad verticem totumque caput, deinde ad cervicem & scapulam & pedetentim a dextro latere, per dorsum, ad nates & sic porro, non sine summo dolore, per totum pedem dextrum ad talum usque cursum suum direxit ibidemque tandem absolvit. SEBITZIVS, cui bis tantum in Praxi obtigit hic affectus, vocat eundem *volaticam infantum*, quoniam tenerioribus & juuioribus subjectis solennior esse observatur, quam adultis; a WITTICHIO vero & SENNERTO *macularum voloticarum* titulum obtinuit, quos etiam Germani, eundem communiter, das Geflüg, den Flug, das Flug-Feuer, die lauffende Rose &c. appellitantes, imitati sunt: E contra autem Celeb. D. D. RAIMANNO placuit in *Miscellan. Phys. Med. Mathemat. Anno 1727. Meus. April. Class. IV. Art. 4.* hanc singularem Erysipelatis speciem ad *herpetes*, a serpendo ita dictos, referre, quoniam horum inflammatio media quasi est, ratione gradus, inter Erysipelas verum & Phlegmonem simulque tumorem & duriores & majorem exhibet, quam proprie ita dictum Erysipelas, adeoque putat, quod vel a forma *herpes miliaris esticomenos*, vel a loco affecto *Herpes cingens* seu zona, vel juxta PLINIUM Zoster, quod scilicet hominem



minem medium ambiat, aut illam præcipue regionem occupet, cui cingulum applicari, quæque propterea ab Anatomicis zona vocari solet, vel denique juxta ET T-MÜLLERI mentem, *Herpes Erysipelatosus* appellari queat. vid. etiam *A. N. C. Dec. I. Ann. 3. obs. 287.* de differentia autem inter hanc & fixam erysipelaceam inflammationem, de qua potissimum hic agere lubet, non opus erit ut ulterius quædam addamus, cum ea ex hætenus traditis phœnomenis abunde jam pateat.

§. VII.

Porro *simplex Erysipelas* illud vocatur quod nudam inflammationem in superficie partis affectæ exhibet absque ulla ulteriori ejusdem deformatione & depravatione; *vesiculare* autem illud dicitur, in quo pustulæ pellucidæ modo minores, modo majores, hinc & inde simul erumpunt, tandemque ruptæ copiosum serum profundunt, & paucorum dierum intervallo crustosæ fiunt ac decidunt. Vulgus hanc speciem vocat *die Blasen-Rose*, oder *die blâsigte Rose*, omniumque maxime eandem formidare solet, quoniam graviora ut plurimum symptomata præ simplicibus erysipelaceis inflammationibus inferre, caput & faciem inprimis occupare aut etiam per alias partes obambulare, simulque cum hæmorrhoidibus molientibus non raro conspirare solet, prout hoc, inter alia, exempla a Celeb. D. D. ERNESTI in *Annal. Med. Phys. Ao. 1722. Mens. Aug. Class. II. Art. 3. §. 3.* & RIEDLINO in *Curat. Med. Cent. V. observ. 65.* recensita confirmant.

§. VIII.

Præterea etiam respectu symptomatum distin-



guendæ veniunt hæ inflammationes in *criticas* & *symptomaticas*, si nimirum febres antecedentes, quibus non raro quoque superveniunt, spectes: Priores vocamus illas, quæ in morbi statu, per certa signa antecedentia prius indicatæ, tempore critico prorumpunt, in sequente brevi post febris solutione modo omnimoda, modo duntaxat aliquali; posteriores autem sunt, quæ statim in morbi principio, prius non indicatæ, extra diem criticum prorumpunt, febre postmodum vel in eodem tenore continuante, vel quodammodo etiam augescente, cum notabili virium roboris imminutione. Ratione partis affectæ quidam etiam distinctionem inter Erysipelas *internum* & *externum* formant, sed minus necessariam magisque impropriam, quoniam hoc ipsum vocabulum in strictiori sensu tantum affectum externum cutaneum inflammatorium denotat, in latiori vero & abusivo quandoque etiam de partibus internis, seu visceribus inflammatis dicitur, adeoque in Praxi vix utilitatis quicquam afferent illæ, ab AETIO *Lib. V. Cap. 89.* ex diversis partibus Erysipelate affectis formatæ variæ febrium ardentium species, dum Lipyriam appellat febrem, quæ fit ex Erypelate in ventriculo, Typhodem quæ in hepate & *crymodem*, quæ in pulmonibus occurrit; aut etiam illorum distinctiones, qui inter Erysipelas Uteri, Hepatis, Pulmonum, Lienis &c. & veram inflammationem Uterinam, Peripnevmoniam, Hepatitidem, splenitidem &c. singularem quandam & vix gradualem formant & agnoscunt differentiam, quoniam horum pariter ac aliorum viscerum inflammationes, tam erysipelacæ, quam phlegmonodeæ,



deæ, licet ratione periculi aliqua inter ipsas intercedat differentia, unam tamen eandemque medendi methodum absolute requirunt, hujusque ratione vix unquam exacte a se invicem distingui possunt.

§. IX.

Præmissis nunc iis, quæ ad diversas inflammationum erysipelacearum differentias spectant, circumstantiis, ad earundem historiam ut nos accingamus ordinis ratio postulat. Incipiunt ergo ordinarie cum horripilatione insolita aut plenario etiam horrore, totum non solum corpus, sed & in specie partem & regionem illam, in qua apparituræ sunt, admodum moleste occupante & per integram communiter horam, immo quandoque diutius detinente, cui dein statim succedit calor intensior febrilis, modo levior, modo gravior, pro diversitate magnitudinis ipsius staseos & partis affectæ conditione, siquidem ille minoris semper momenti existit, si ad extremitates, maxime inferiores, vergunt inflammationes istæ, vehementior e contra, si diffusa magis est stasis partesque superiores & præcipue pectus, collum & caput, occupat, ubi etiam insimul reliqua symptomata tanto magis exacerbantur, concurrentibus insuper cephalalgis & non raro deliriis. Durante hoc æstu persentiscunt etiam subjecta afflicta statim dolorem aliquem congestorium & quasi pressorium in eadem parte, quem tumor æqualis latius plerumque diffusus excipit, qui brevi temporis intervallo tanta sumit incrementa, ut cutis per totum ejus ambitum nitescat, cum superveniente dolore pungitivo instar acicularum, & leviter ardente, satis tamen adhuc tole-



tolerabili, si in ordinario seu mitiori gradu constitutæ sunt hæ inflammationes.

§. X.

Interea apparet etiam successive in parte & regione ita affecta color rubicundus dilutior, seu roseus, totum tumorem expansum occupans & adhuc nitidiorem reddens, non tamen admodum arcte ipsi inhærens, siquidem digitorum qualicunque pressioni statim cedit cutemque albicantem relinquit, remotis autem digitis facile quoque redit, quoniam congesti & coacervati ibidem humores in plenariam & perfectam stasim nondum sunt deducti, sed mobiliiores & quodammodo fluidi adhuc existunt, adeoque facili negotio intra fibrarum musculosarum interstitia reprimi & ad tempus ibidem detineri possunt. Proinde etiam tumor ipse non tam alte elevatur, nec adeo durus & intense rubicundus redditur, uti in aliis gravioribus inflammationum speciebus, ob minorem nempe humorum congestorum & stagnantium quantitatem leviolem affluentis & ad facilitandam ejus resolutionem transeundis sanguinis impetum & paulo majorem adhuc coacervati humoris mobilitatem & expansionem, cum e contra in phlegmonodea & apostematodea inflammatione perfecta stasis, adeoque crassior & angustioribus limitibus inclusus humor præsto sit, qui duritiem, ruborem & magnitudinem tumoris necessario grandiolem reddere debet.

§. XI.

Solet autem hic tumor ordinarie ad minimum per tres quatuorve dies ita persistere, & tunc si legitime tractatur, ob subsequenter stagnantium humorum resolutionem



lutionem & discussionem, sponte decrefcit, colore flavefcit tandemque penitus & cum euphoria fubjectorum evanefcit, quippe faluberrimus omnium inflammationum eft eventus; quodfi vero incongrua arte & per intempeftive adhibita emollientia, pingua & unguinofa forfitan ad maturationem disponatur, tunc quidem veram & laudabilem fuppurationem haud fubit, in corruptionem vero ferofo-falfam tanto certius tranfit, quæ dein non folum admodum refractaria & rebellis exiftit, fed & facillime ferpiginoforum ulcerum indolem affumit & in partes adjacentes fefe diffundit, atque tunc plenariam consolidationem ægerrime admittit. Quod vero infuper quoque hæ inflammationes quandoque veficulas, modo minores & copiofiores, modo majores & rariores fimul exhibeant, quandoque etiam hinc & inde evagentur & per reliquas partes fucceffive obambulent, fuperius circa differentias jam indicavimus, & propterea heic loci merito omittimus.

§. XII.

Ad ætiologiam horum fymptomatum antequam nunc progrediamur, paucis etiam fubjecta inflammationibus hifce potiffimum expofita, examinanda & describenda erunt. In genere igitur præcipue omnes plethorici, ob abundantem, quam gerunt, fanguinis quantitatem ejusque propterea faciliorem ad ftagnationes hinc & inde fubeundas proclivitatem, his aliisve inflammationibus frequentius obnoxii deprehenduntur; in fpecie vero fanguinei, habitu laxiori, porofiori & succulentiori præditi, in quem fub qualicunque commotione fanguis non folum copiofius irruere ac intimius penetrare, fed & facilius ibidem ftagnare, ob lymphæ autem tenerioris commixtionem non femper ita exquisitas, graves & fervidas inflammationes excitare poteft, quin potius pro levioribus & fuperficialibus hifce eryfipelaceis formandis magis quadrat: Specialiffime tandem illi, qui corporis neceffarias commotiones debitumque & conveniens regimen negligunt, animo vero tanto fenfibiliores ejusque crebrioribus & vehementiori-

C

bus



bus pathematibus, humorum motum eximie turbantibus & alterantibus suscipiendis tanto aptiores existunt. Quod autem *speciale*, seu ita dictum *subjectum invasionis* harum inflammationum attinet, illud utique tota externa corporis peripheria, sive ipsa cutis constituit, utpote ob sui ignobilitatem, debilitatem, raritatem & laxitatem, vasorumque capillarium copiosum transitum, universali quasi totius corporis emunctorium, in quod alias natura ordinarie maximam impuritatum partem deponere & exinde eliminare allaborat. Inter ipsas autem externas superficiei hujus partes & regiones quaedam frequentius affliguntur ab his inflammationibus, videlicet artus, tam inferiores, quam superiores, qui, utpote a nobilioribus visceribus magis remoti pauloque robustiori structura præditi, facilius tales decubitus stagnatorios suscipere atque perferre valent; quaedam vero rarius, ex provida naturæ directione, ob majoris periculi metum, texturæ singularem conditionem & subjacentium partium nobilitatem infestantur, nempe caput & imprimis genæ, faciles alias ruboris susceptrices, nares, collum, mamma, genitalia, &c. ex quibus si quoque forsitan aliqua paulo frequentius his inflammationibus exponatur, erit illud certe vel naturæ erranti, vel partis imbecillitati, vel consuetudini, vel concitatiore etiam humorum affluxui imputandum.

§. XIII.

Tradita sic historica erysipelacearum inflammationum descriptione, nunc utique ordinis ratio postulat, ut pro ingenii viribus in illas quoque causas inquiramus, quibus natales suos illæ ordinarie debent, ubi pro *causa immediata* & *proxima* unice reputamus diffusiores, latiores & superficialem quandam stasim sanguinis tenuioris, cum subtili lymphæ & sero acriori paulo magis remixti, & salutari consilio, mediantibus congestoriis & translatiis motibus, a natura versus corporis peripheriam translati, ut, obtenta prius ulteriori sui resolutione & abstersione, tanto facilius per commune & universale hoc emunctorium eliminari

&



& removeri queat. *Causam vero mediatam* propinquiorem sistit repentina & activa portiois istius inquinatæ versus externas corporis partes suscepta congestio, eaque non tumultuaria, sed satis proportionata atque salutaris, cum nempe in finem instituta, ne circa nobiliora viscera diutius forsitan obhærescens, in actualem coagulationem & corruptionem fonticam atque periculosam ibidem delabatur, pro qua dein etiam in extrema corporis superficie avertenda, principium vitale laboriosa intentione & conamine inflammatoriam commotionem excitat, sanguinem nempe paulo copiosius & impetuosius versus hanc regionem impellendo, ut sub vegetiori & celeriori ejusdem transitu (unde ordinarie tumor, rubor & æstus auctior oriuntur) successive stagnantis humoris portiones quædam abstergantur & divellantur sicque discussorius magis, quam suppuratorius effectus obtineatur, quippe qui ultimus ordinarie magis noxius atque perversus existit, quoniam ipsa illa stasis magis lymphatica & serosa, quam mere sanguinea est, adeoque dum tota hæc lymphæ quantitas tempestive, prout opus est haud præpari & coerceri potest, sed inordinate suppuratur & ob principiorum pinguium & oleosorum abundantiam ad corruptionem fermentativam & serpiginosam magis vergit, necessario exinde mali moris ulcera, latius evagantia admodum rebellia & consolidationem non nisi irregularem admittentia, emergunt & cum summa afflictorum subjectorum molestia atque ac damno introducuntur.

§. XIV.

*Causarum denique mediarum remotiorum seu occasionalium*, nomine utique nobis veniunt omnia illa, quæ lympham & sanguinem ad ejusmodi insolitam spissescientiam & stagnationem disponere horumque humorum decubitus & translationem versus exteriores corporis partes facilitare & invitare possunt, quorsum referimus ex *naturalium rerum classe* Temperamentum Sanguineum &, qui cum hoc ordinarie sociatus est, habitum corporis phlogisticum, spon-



spongiosum & carnosum, qui ordinarie admodum succulentus est, hancque ob causam & promovendis & fovendis qualibuscunque humorum stagnationibus tanto magis favet. Sic quoque huc pertinet *hereditaria dispositio* multum pariter ad crebriorem harum inflammationum, certis sapissime familiis maxime solennium & quasi propriarum, provocationem & excitationem faciens, quatenus nimirum, juxta *Harvei* mentem, facillime à parentibus erysipelate ante hac sæpius vexatis, cum semine vel sanguine materno, vitiosæ ejusmodi dispositionis ideo foetui imprimitur, hæcque dein cum tempore suscitatur, in actum atque ob levissimam sæpe causam tandem in consuetudinem deducitur. Ratione *ætatis* equidem nullam fere, præter senilem, hic excipere possumus, cum in omnibus reliquis indiscretim occurrere observentur hæ inflammationes, infantili tamen, puerili & juvenili, propter plethoram & frequentiores orgasticas ejus commotiones crebrioresque in regimine occurrentes errores, aliquam concedimus prærogativam, non exclusâ consistente virili ætate, quæ, licet rarius patiatur has inflammationes, tanto tamen periculosius ab iisdem infestatur. Similiter comparatum est cum *Sexu*, nullam pariter exceptionem admittente, nisi quod sæmellis junioribus, succulentis & frequentioribus menstrui fluxus ataxiis expositis utique paulo solenniores existant hæ inflammationes præ maribus non semper usque adeo plethoricis.

§. XV.

Ex *non naturalibus rebus* suum pariter huc contribuit symbolum *Aer*, tam nimium calidus & æstuosus, quam frigidus, quatenus nempe ille, corpora diutius ambiens, peripheriam eorundem nimium quantum relaxat, copiosiores humorum affluxum eo provocat & lymphaticos succos magis inspissat; hic vero ipsorum superficiem constringit humoresque ibidem stabulantes ad stagnationem graviolem disponit: Hinc quoque per experientiam deprehendimus, quod in sensibilibus subjectis quandoque



que etiam diuturna tantum commoratio sub ardore solis, aut gravior ignis æstus in foco culinario, ad provocandas hæc inflammationes occasionem subministrant. *Alimenta* quoque nimium aromatizata, acria, sicca, salsa, oleosa & pingua, in nimia copia assumpta, nec non *potulenta* generosiora vinosa & spirituosæ, vel ipsa etiam calida decocta, frequentius & copiosius ingurgitata, sanguinem orgastice commovendo & exagitando multum huc faciunt. *Somnus* longior humores augendo & inspissando, *vigiliæ* vero nimium protractæ, serum absorbendo & sanguinis massam inæqualiter commovendo, facilem itidem his inflammationibus occasionem præbent, quod & de *motu* nimio & *quiete* immodica certissime expectare licet. *Animi pathemata*, præprimis vero *ira* & *terror*, quatenus vel repentinas humorum expansiones, vel eorundem graviores restrictiones & retropressiones inducunt, omnium maxime introducendis hisce inflammationibus favent, prout hoc innumera exempla illorum qui ex levissima sæpe animi commotione erysipelate infestantur, abunde comprobant. Quid tandem *excretorum* & *retentorum* vitia, si nimirum consuetæ alvinæ, transpiratoriæ, inprimis autem hæmorrhagicæ excretiones retardantur, aut penitus sufflaminantur, ad producendas hæc inflammationes conferre valeant, cum per quotidianam abunde jam liqueat experientiam ob chartæ & temporis angustiam fusius jam percellere & demonstrare haud valeo, cuilibet autem sufficienter jam cognitum esse certissime mihi persuadeo.

#### §. XVI.

Inter *præternaturales res* primarium utique locum sibi vendicant febres, maxime continuæ, harumque vel per adstringentia, vel volatilia & nimium commoventia factæ incongruæ turbationes, quibus provida natura non raro adformandas tales metastases retentæ materiæ febrilis cogitur. Dein huc referendi etiam sunt illi affectus, qui organicam sanguinis effervescentiam facile concitant, videlicet



partus difficilis, sudoris repentinae retropulsiones, aut nimia diaphoreses, &c. item pruriginosa scalptiones, quibus major humorum affluxus versus peripheriam corporis invitatur, & stagnationi successura eorundem facillior via panditur. Non omittendae sunt inconsultae retropulsiones excretionum subcutanearum, scabiei inprimis, item dolorum spastico-arthriticorum tractationes per refrigerantia, nec non graviores musculosarum partium vulnerationes aut contusiones, sub quibus omnibus facile stagnationes aut stases humorum, utpote primaria inflammationum erysipelacearum fundamenta, in extrema corporis superficie inducuntur & excitantur.

§. XVII.

Ratione *Prognoseos* de inflammationibus hisce notandum est, quod, licet rarius lethales evadant, tamen si altiores semel in cutis glandulis miliaribus radices egerint, satis rebelles existant & semel licet iterumque profligatae tamen usque recurrant facileque in consuetudinem degenerent atque tunc levissimis quoque ex causis frequentissime repullulent. Si rite tractantur ordinarie breviter terminantur, intra tres nimirum vel ad summum quatuor dies; quando vero ultra quartum diem, absque cessatione tumoris, duritici ardoris & doloris punctorii, continuant, imo magis insolescunt, tunc plerumque maxime necessariam & utilissimam sui discussionem non solum respuunt, sed & certissime in ulcerationem fermentativam, acrem & serpiginosam, admodum rebellem & fonticam, degenerant, quod etiam facillime evenit, si emollientibus, relaxantibus, unguinosis & humidis inconvenienter tractantur. Si ulceribus, vulneribus, fracturis aut ossium denudationibus superveniunt, periculosiores semper existunt, quam si in partibus sanis exoriuntur, sic quoque peiores semper sunt, si in capite, collo, pectore, inguinibus, genitalibus &c. &c. occurrunt, & si febrem exquisitam complicatam habent, quoniam gravior tunc ordinarie solet esse inflammatio. **Omnium pessime semper succedunt, si per externa refrigerantia**



gerantia & adstringentia ad interiora retropelluntur, quoniam plerumque Gangranam & proxime subsequentem sphacelum in visceribus post se trahunt mortemque certissimam hac ratione inferunt; confer. HIPPOCRATIS *Aphorif. 25. Sect. VI.* E contra optime & salutariter terminantur, si sub auctiori transpiratione peripherica stases istæ discutiuntur, id quod certissime hariolari licet, quando vel pruritus vel formicarum sensus supervenit atque cuticula in squamas quasi fatiscit, colorque & calor in ordinarium & consuetum sensim mutantur.

§. XVIII.

Consideratis ergo nunc iis, quæ ad inflammationum erysipelacearum cognitionem theoreticam spectant, inoffenso pede ad tradendam ipsarum medendi methodum, quæ ipsius rei caput est, nos accingimus, eamque tribus hisce indicationibus potissimum superstruendam esse censemus I) *Ut nimius humorum affluxus, statum huncce inflammatorium communiter pejorem reddens, modeste intercipiatur.* II) *Stases discussio & resolutio debite promoveatur &* III) *Ulceratio quacunq[ue] ex ratione inopinato superveniens debite mundificetur & consolidetur.*

§. XIX.

Prima indicatio equidem non in omnibus ejusmodi inflammationibus indiscretim necessaria est, sed in iis duntaxat, quæ vel in primo sui initio statim impetuosiores sunt, vel in subjectis nimium plethoricis, sanguineis, lautiori diætæ & V. Snibus antehac adsuētis, otiosis, & ordinararum hæmorrhagiarum suppressione, vel saltem imminutione laborantibus, occurrunt: Tunc enim optime & commodissime hic scopus impetratur per V. Snes, vel quandoque, in adsuētis nimirum & succulentioribus, per scarificationes in partibus oppositis & remotioribus potissimum celebrandas, hac tamen sub caurela, ut admodum tempestive & in primo statim principio instituantur, antequam febriles qualescunque motus persentiscuntur, alias plerumque plus obstant quam prosunt. Quod si vero prædictæ cir-



cumstantiæ nullam harum ventilationum admittant, tunc ad minimum frictiones modestæ partium oppositarum nec non interne temperantia, nitrosa & acidulata qualiacunque in usum trahenda erunt, sub quarum sedula & convenienti continuatione itidem aliqualis humorum revulsio obtineri, & gravius harum inflammationum augmentum præcaveri potest, imprimis si alvus simul debito modo aperta servetur.

§. XX,

*Altera indicatio*, in qua potissimum totius rei cardo vertitur, securissime impetratur per propinata interna blanda diapnoica alexipharmaca, resolventia & salina digestiva, videlicet in forma pulverum ꝓ diaphoret. Bezoard. min. C. C. S. Δe ppt. unicorn. fossil. Ocul. ☿. cum acetosit. citr. ppt. Marr. perl. ppt. Lap. bezoard. orient. & occident. Lap. de Goa, Pulveres bezoardicos Sennerti, Wedelii, Anglicanum, Succin. alb. ppt. Arc. duplic. Qum depurat. & ꝓ iatum, ꝓum Qlat. amar. ☿ nativ. & ꝓ nii &c. quales pulveres ad ꝓi pro dosi, pomeridianis & vespertinis horis bis vel ter exhiberi, aut cum ∇is diapnoicis, nempe C. B. Scord. Flor. Samb. Galeg. Scabios. &c. atque similibus syrupis remisceri atque iisdem temporibus sub Potionum forma propinari possunt. In Essentiis autem optime conducunt Essent. Alexipharmaca Stahl. aut in serosioribus Ess. Pimpinell. alb. Succin. Imperat. Angelic. TRa ꝓ nii, ꝓri, TRa bezoard. Wed. & Michael. quæ parcioribus quidem, sed repetitis dosibus, ad gtt. XXV. vel XXX. horis antemeridianis bis vel ter ordinanda sunt. Quo vero tanto facilius salutaris hic scopus discussionis obtineatur, insimul quoque cum internis hisce socianda & conjungenda sunt externa, videlicet sacculi ex Rad. Ir, Flor. Levist. Liquir. Flor. Samb. Chamom. Rom. Farin. Fab. fecalin. hordei, lupinorum, Ceruss. Bolo armen. & Camphora, tepide in forma sicca applicandi, aut etiam Vini Camphoratus & crocatus immodica quantitate lintheaminibus instillari, sicque parti affectæ interdum applicari potest, cavendo tantum, ne vel diutius, vel copiosius



pius hic adhibeatur atque hac ratione inflammationem augeat vel ipsam etiam statim pertinaciorē reddat magisque inspisset.

§. XXI.

Quodsi vero denique contingat, ut præter omnem spem & opinionem, quacunque de causa inflammatio talis erysipelacea in ulcerationem transeat, tunc ut *tertiæ indicationi* satisfiat, ante omnia inquinamentum ulcerosum abstergatur per applicationem ☉ Philosophor. dein secessio hujus corruptelæ adjuvetur parsque affecta mundificetur mediante ☉ eo Ovor. vel ceræ, Liquamine Myrrh. aut egregia & efficacissima illa Essentia balsamica Illustr. Stahlii, ad minimum bis de die applicanda, conjungendo simul moderata camphorata & discutientia, in ambitu sedulo imponenda, nec non interne propinanda Essentias antiscorbuticas & sanguinem mundificantes, in primis Essent. Trifol. fibr. Fumar. Centuar. min. Pimpin. alb. Succin. Lignor. atque Tincturas alcalinas, interpositis pulveribus absorbentibus & Pilulis balsamicis laxantibus, sub quorum regulari & continuato usu, subjuncta simul convenienti diætâ, tandem quoque felicem & plenariam talium refractariorum ulcerum consolidationem sperare licet.

T A N T V M.

S. D. G.





**J**Am FRIDERICE Tibi vestis sic fulget honoris,  
Quâ Te, pro meritis, induit ars Medica.  
Gratulor hos, Fautor, toto Tibi pectore honores,  
Annuat his cæptis magnus Jova Tuis.

*Hiscæ paucis gratulatur*

**D. LAVR. THEOPHIL. LVTHER,**  
Chym. Prof. Publ. Consul Senior, n. n. Phys. adj.

---

**C**Um TIBI pro meritis multoque labore subactò,  
Hoc, studii pretium tradit Hygea, die,  
Apprecor ut felix longeque fruaris honore,  
Qui TIBI splendori sit, decus atque TVIS,  
In Praxique feras multum solaminis ægris,  
Sæpius ut crescat gloria lausque TIBI.

*Ita*

Nobilissimi Domini Doctorandi *meritissimis*  
*honoribus applaudit, prospera quævis simul*  
*ominaturus,*

**D. ANDREAS ELIAS Büchner,**  
Institut. Med. Prof. Publ. Facult. Med. Assessor  
Extraord. & S. R. I. Academ. Nat. Curios  
Adjunctus.

---

**H**ic mea musa Tibi latans, *doctissimæ* RILCKE,  
In altum sistens officiosa venit.  
Gratulor atque Tibi, quum sis coronatus honore,  
Crescat & augeſcat quolibet ille die:  
Vive diu felix, Patriæ splendorque decusque  
Ægris & multis sis simul auxilio.

*His Prænobilissimo Domino Doctorando, Fautori  
ac Amico suo suavissimo, prospera quævis  
adprecari ac se simul perpetuæ Ipsius be-  
nevolentie ac ulteriori amicitie optimæ  
commendare voluit,*

**ABRAHAM JOHN, Siles. M. St.**